

HOKOEX

Insekticid (larvicid)

SASTAV

Vodorastvorljive granule: 20 g/kg ciromazin-a(2
Za uništavanje larvi muva

SVOJSTVA

HOKOEX se koristi za uništavanje larvi kućne muve (*Musca domestica*), stajске muve (*Stomoxys calcitrans*) u stajama, otvorenim stajama, u đubrištu i prostirkama za životinje. Sadrži sredstvo za suzbijanje rasta koji deluje specifično na sve larve muve, a ne utiče na odrasle jedinke.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE

Doziranje je uvek 250g HOKOEX-a na 10 m² površine. Način upotrebe zavisi od sadržaja vode u materijalu koji obrađujemo. Mogućnosti upotrebe su sledeće

- posipanje granulata neposredno na površinu (250g na 10 m²),
- prskanje (250g granulata rastopimo 1 do 4/ vode i poprskamo po 10 m² površine),
- polivanje (250g granulata rastopimo u 4 do 10/ vode i polijemo po 10 m² površine).

Uništavanje larvi moguće je i u naseljenim stajama. Tretiranje ponavljamo svakih 6 nedelja, odnosno čim je zadnji obrađeni sloj pokriven sa 10 cm stajskog đubrišta. Kod upotrebe HOKOEX-a potrebno je sprečiti neposredan kontakt proizvoda sa životinjama, kontaminaciju hrane, aparata za hranjenje, uređaja za napajanje i mužu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HOKOEX se nanosi svuda gde se mogu razvijati larve muva:

- U stajama za goveda, svinje, konje: granulat nisko posipamo. Uz zidove i ivice, ispod instalacija itd. obradimo sa kanticom za zalivanje ili leđnom prskalicom. Na tečno đubrivo posipamo direktno. Prvi put larve uništavamo približno 1 do 3 dana nakon odstranjivanja đubrišta.
- U stajama za goveda s rešetkama, ravnomerno posipamo HOKOEX-om.
- U stajama za svinje: ako je pod potpuno rešetkast preporučljiva je obrada celokupne površine, a ako je pod delimično rešetkast obradimo celokupnu površinu rešetki i područja za ležanje. Preporučljiva je i obrada površina pre punjenja staje, odnosno nakon odstranjivanja đubrišta ili nakon pražnjenja đubrišne jame..
- U stajama za živinu kod suve prostirke raspršujemo s kanticom za zalivanje ili sa leđnom prskalicom. Kod mokre prostirke ili đubrišta tretiramo s posipanjem granulata. Kompletanu površinu đubrišta obradimo približno nedelju dana nakon useljenja i pre nego je sloj đubrišta deo 10 cm.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu

Proizvođač: HOKOCHEMIE gmbh ŠVAJCARSKA
Uvoznik i distributer: PHARMAVET d.o.o. Beograd
Pakovanja: 1kg, 5kg, 10kg i 25kg

